



ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJA SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VĚSKRÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI NÁSTROJE.

CHEFCE-LI POUŽIVAT SYSTÉM CRYO/CUFF SO ZARUĐENÍM AIRCAST CRYO/CUFF IC, NEZABUDTE SI PŘECÍTAT VŠECHNÝ POVKY UVEDENÉ V NAVODU K POUŽITÍ JEDNOTKY AIRCAST CRYO/CUFF IC.

PROFILO ZAMĚŘENÝ NA UŽIVATELE: Zaměřený uživatelem je zdravotnický pracovník s pacientem, pacientem nebo asistující hodinou příslušníkem. Uživatel musí být:

- přesný a porozumějící instrukcím, varováním a upozorněním.

PRINCIP FUNKOVANÍ: Kryonadeta AirCast Cryo/Cuff zajistuje ležbu chladom a komprese.

ÚČEL POUŽITÍ/INDIKACE: Kryonadeta AirCast Cryo/Cuff kombinuje fokální komprezi a chladu, minimizuje otoky a bolesti.

FREQUENCE POUŽITÍ/NAVOD: Především používáte Cryo/Cuff stanov lákat v závislosti na individuálních potřebách pacienta. Tento produkt může při příliš nízké teplotě způsobit výraznou kůži ježutu a prudkou kontrole.

KONTRAINDIKACE: Kryoterapie neby měla být používána u osob s Raynaudovou chorobou nebo v okolí oblasti licheni. Kryoterapie může provozeni tělou a rukou, když se vysoké teploty výrazně zvýší.

KONTRAINDIKACE: Kryoterapie může být uvedena na pacienty s Raynauds syndromem, který je charakterizován hyperemia, významnou kachexií, hypotermií, periferními a jinými onemocněními, které jsou způsobovány ischemií nebo spárovou místní cirkevnici, místní tkávovou infekcí, lokální aerožerapie, plicitivností na chlad, přechodzoucí omrzlinami a místním chladovou hemoglobinem.

Pokud jste alergicki na jakékoli materiály obsažené v tomto produkto, nepoužívejte jej.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ:

- Tento produkto může při příliš nízké teplotě způsobit výraznou poškození, když se vysoké teploty výrazně zvýší. Je nutné, aby byl schopen rozpoznat, že je pod manžetou a může využít rukou a tělem reakci na chladou kůži, aby se mohl zastavit.
- **ÚČEL POUŽITÍ/INDIKACE:** Kryonadeta AirCast Cryo/Cuff kombinuje fokální komprezi a chladu, minimizuje otoky a bolesti.
- **FREQUENCE POUŽITÍ/NAVOD:** Především používáte Cryo/Cuff stanov lákat v závislosti na individuálních potřebách pacienta. Tento produkt může při příliš nízké teplotě způsobit výraznou kůži ježutu a prudkou kontrole.
- **KONTRAINDIKACE:** Kryoterapie neby měla být uvedena na pacienty s Raynauds syndromem, který je charakterizován hyperemia, významnou kachexií, hypotermií, periferními a jinými onemocněními, které jsou způsobovány ischemií nebo spárovou místní cirkevnici, místní tkávovou infekcí, lokální aerožerapie, plicitivností na chlad, přechodzoucí omrzlinami a místním chladovou hemoglobinem.

Pokud jste alergicki na jakékoli materiály obsažené v tomto produkto, nepoužívejte jej.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ: Všechny rukavice mohou být používány na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KRYONADETA A UPOZORNĚNÍ: • Tento produkto může být používán na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ: • Tento produkto může být používán na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KRYONADETA A UPOZORNĚNÍ: • Tento produkto může být používán na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KONTRAINDIKACE: Kryoterapie může být uvedena na pacienty s Raynauds syndromem, který je charakterizován hyperemia, významnou kachexií, hypotermií, periferními a jinými onemocněními, které jsou způsobovány ischemií nebo spárovou místní cirkevnici, místní tkávovou infekcí, lokální aerožerapie, plicitivností na chlad, přechodzoucí omrzlinami a místním chladovou hemoglobinem.

Pokud jste alergicki na jakékoli materiály obsažené v tomto produkto, nepoužívejte jej.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ: Všechny rukavice mohou být používány na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KRYONADETA A UPOZORNĚNÍ: • Tento produkto může být používán na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KONTRAINDIKACE: Kryoterapie může být uvedena na pacienty s Raynauds syndromem, který je charakterizován hyperemia, významnou kachexií, hypotermií, periferními a jinými onemocněními, které jsou způsobovány ischemií nebo spárovou místní cirkevnici, místní tkávovou infekcí, lokální aerožerapie, plicitivností na chlad, přechodzoucí omrzlinami a místním chladovou hemoglobinem.

Pokud jste alergicki na jakékoli materiály obsažené v tomto produkto, nepoužívejte jej.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ: Všechny rukavice mohou být používány na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KRYONADETA A UPOZORNĚNÍ: • Tento produkto může být používán na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KONTRAINDIKACE: Kryoterapie může být uvedena na pacienty s Raynauds syndromem, který je charakterizován hyperemia, významnou kachexií, hypotermií, periferními a jinými onemocněními, které jsou způsobovány ischemií nebo spárovou místní cirkevnici, místní tkávovou infekcí, lokální aerožerapie, plicitivností na chlad, přechodzoucí omrzlinami a místním chladovou hemoglobinem.

Pokud jste alergicki na jakékoli materiály obsažené v tomto produkto, nepoužívejte jej.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ: Všechny rukavice mohou být používány na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KRYONADETA A UPOZORNĚNÍ: • Tento produkto může být používán na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KONTRAINDIKACE: Kryoterapie může být uvedena na pacienty s Raynauds syndromem, který je charakterizován hyperemia, významnou kachexií, hypotermií, periferními a jinými onemocněními, které jsou způsobovány ischemií nebo spárovou místní cirkevnici, místní tkávovou infekcí, lokální aerožerapie, plicitivností na chlad, přechodzoucí omrzlinami a místním chladovou hemoglobinem.

Pokud jste alergicki na jakékoli materiály obsažené v tomto produkto, nepoužívejte jej.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ: Všechny rukavice mohou být používány na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KRYONADETA A UPOZORNĚNÍ: • Tento produkto může být používán na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KONTRAINDIKACE: Kryoterapie může být uvedena na pacienty s Raynauds syndromem, který je charakterizován hyperemia, významnou kachexií, hypotermií, periferními a jinými onemocněními, které jsou způsobovány ischemií nebo spárovou místní cirkevnici, místní tkávovou infekcí, lokální aerožerapie, plicitivností na chlad, přechodzoucí omrzlinami a místním chladovou hemoglobinem.

Pokud jste alergicki na jakékoli materiály obsažené v tomto produkto, nepoužívejte jej.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ: Všechny rukavice mohou být používány na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KRYONADETA A UPOZORNĚNÍ: • Tento produkto může být používán na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KONTRAINDIKACE: Kryoterapie může být uvedena na pacienty s Raynauds syndromem, který je charakterizován hyperemia, významnou kachexií, hypotermií, periferními a jinými onemocněními, které jsou způsobovány ischemií nebo spárovou místní cirkevnici, místní tkávovou infekcí, lokální aerožerapie, plicitivností na chlad, přechodzoucí omrzlinami a místním chladovou hemoglobinem.

Pokud jste alergicki na jakékoli materiály obsažené v tomto produkto, nepoužívejte jej.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ: Všechny rukavice mohou být používány na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KRYONADETA A UPOZORNĚNÍ: • Tento produkto může být používán na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KONTRAINDIKACE: Kryoterapie může být uvedena na pacienty s Raynauds syndromem, který je charakterizován hyperemia, významnou kachexií, hypotermií, periferními a jinými onemocněními, které jsou způsobovány ischemií nebo spárovou místní cirkevnici, místní tkávovou infekcí, lokální aerožerapie, plicitivností na chlad, přechodzoucí omrzlinami a místním chladovou hemoglobinem.

Pokud jste alergicki na jakékoli materiály obsažené v tomto produkto, nepoužívejte jej.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ: Všechny rukavice mohou být používány na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KRYONADETA A UPOZORNĚNÍ: • Tento produkto může být používán na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KONTRAINDIKACE: Kryoterapie může být uvedena na pacienty s Raynauds syndromem, který je charakterizován hyperemia, významnou kachexií, hypotermií, periferními a jinými onemocněními, které jsou způsobovány ischemií nebo spárovou místní cirkevnici, místní tkávovou infekcí, lokální aerožerapie, plicitivností na chlad, přechodzoucí omrzlinami a místním chladovou hemoglobinem.

Pokud jste alergicki na jakékoli materiály obsažené v tomto produkto, nepoužívejte jej.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ: Všechny rukavice mohou být používány na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KRYONADETA A UPOZORNĚNÍ: • Tento produkto může být používán na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KONTRAINDIKACE: Kryoterapie může být uvedena na pacienty s Raynauds syndromem, který je charakterizován hyperemia, významnou kachexií, hypotermií, periferními a jinými onemocněními, které jsou způsobovány ischemií nebo spárovou místní cirkevnici, místní tkávovou infekcí, lokální aerožerapie, plicitivností na chlad, přechodzoucí omrzlinami a místním chladovou hemoglobinem.

Pokud jste alergicki na jakékoli materiály obsažené v tomto produkto, nepoužívejte jej.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ: Všechny rukavice mohou být používány na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KRYONADETA A UPOZORNĚNÍ: • Tento produkto může být používán na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KONTRAINDIKACE: Kryoterapie může být uvedena na pacienty s Raynauds syndromem, který je charakterizován hyperemia, významnou kachexií, hypotermií, periferními a jinými onemocněními, které jsou způsobovány ischemií nebo spárovou místní cirkevnici, místní tkávovou infekcí, lokální aerožerapie, plicitivností na chlad, přechodzoucí omrzlinami a místním chladovou hemoglobinem.

Pokud jste alergicki na jakékoli materiály obsažené v tomto produkto, nepoužívejte jej.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ: Všechny rukavice mohou být používány na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KRYONADETA A UPOZORNĚNÍ: • Tento produkto může být používán na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KONTRAINDIKACE: Kryoterapie může být uvedena na pacienty s Raynauds syndromem, který je charakterizován hyperemia, významnou kachexií, hypotermií, periferními a jinými onemocněními, které jsou způsobovány ischemií nebo spárovou místní cirkevnici, místní tkávovou infekcí, lokální aerožerapie, plicitivností na chlad, přechodzoucí omrzlinami a místním chladovou hemoglobinem.

Pokud jste alergicki na jakékoli materiály obsažené v tomto produkto, nepoužívejte jej.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ: Všechny rukavice mohou být používány na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KRYONADETA A UPOZORNĚNÍ: • Tento produkto může být používán na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KONTRAINDIKACE: Kryoterapie může být uvedena na pacienty s Raynauds syndromem, který je charakterizován hyperemia, významnou kachexií, hypotermií, periferními a jinými onemocněními, které jsou způsobovány ischemií nebo spárovou místní cirkevnici, místní tkávovou infekcí, lokální aerožerapie, plicitivností na chlad, přechodzoucí omrzlinami a místním chladovou hemoglobinem.

Pokud jste alergicki na jakékoli materiály obsažené v tomto produkto, nepoužívejte jej.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ: Všechny rukavice mohou být používány na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KRYONADETA A UPOZORNĚNÍ: • Tento produkto může být používán na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KONTRAINDIKACE: Kryoterapie může být uvedena na pacienty s Raynauds syndromem, který je charakterizován hyperemia, významnou kachexií, hypotermií, periferními a jinými onemocněními, které jsou způsobovány ischemií nebo spárovou místní cirkevnici, místní tkávovou infekcí, lokální aerožerapie, plicitivností na chlad, přechodzoucí omrzlinami a místním chladovou hemoglobinem.

Pokud jste alergicki na jakékoli materiály obsažené v tomto produkto, nepoužívejte jej.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ: Všechny rukavice mohou být používány na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KRYONADETA A UPOZORNĚNÍ: • Tento produkto může být používán na celou ruku nebo pouze na jednu ruku.

KONTRAINDIK